

C.A.D.C.O. - Actualité - Céréales du 20 avril 1999 (C05)

Suite aux conditions climatiques assez humides des derniers jours, l'accès aux cultures de céréales est assez difficile. La courte période de bon temps du début avril a souvent été consacrée au semis de betteraves et certaines interventions prévues en céréale n'ont pas encore pu être réalisées par tous les agriculteurs.

Dès que le beau temps reviendra, il faudra se remettre à jour, quelques conseils peuvent être utiles.

Escourgeon**Stades**

La plupart des escourgeons sont au stade 2^{ème} nœud ou s'en approchent lorsque les semis ont été réalisés tardivement.

Azote

Si la fraction de redressement n'a pas été appliquée, veillez à l'apporter le plus rapidement possible. Eviter de regrouper les 2^{ème} et 3^{ème} fractions, une trop grosse dose en une fois sensibiliserait trop la culture à la verse.

Désherbage

Si le désherbage n'est pas terminé, veillez à utiliser des produits ne contenant pas de phytohormones.

Régulateur

Le régulateur devra être appliqué au stade dernière feuille en mélange avec le traitement fongicide effectué à ce stade.

Froment d'hiver**Stade**

En fonction de la date de semis, les stades s'étalent du stade 1^{er} nœud pour les semis de début octobre au stade 3 feuilles pour le semis de mars.

Azote

L'état de la végétation est, comme prévu, très variable selon les parcelles. Là où la structure est bonne, où les sols se sont bien drainés, la culture a bien réagi aux premiers apports d'azote et le tallage a été abondant. Dans ces situations, il faut veiller à ne pas trop forcer au niveau de la 2^{ème} fraction.

Par contre, dans les terres abîmées ou dans les situations avec un faible drainage, les cultures poussent lentement et ont peu tallé. Dans ce cas, pour pallier au faible enracinement et faire monter suffisamment de talles, la 2^{ème} fraction doit être légèrement renforcée.

Dans les semis de mars, qui approchent du tallage, il faut apporter une première fraction normale.

Désherbage

Dans les semis d'automne, il conviendra, dès que les conditions le permettront, de terminer les dés herbages.

Dans les semis de fin d'hiver, on pourra appliquer l'isoproturon dès que la culture sera au stade début tallage.

Régulateur

Les semis les plus précoces pourront être raccourcis avec le Cycocel lorsque les conditions de croissance des cultures seront redevenues poussantes.

Dans les semis tardifs, rien ne presse.

Mélanges de produits

Si le mélange azote liquide – régulateur est tout à fait possible, il faut être prudent lors de mélanges azote – herbicide: lorsque la matière active du dés herbant peut provoquer des brûlures ou lorsque les conditions sont favorables à une brûlure par l'engrais liquide, il peut y avoir synergie des deux produits et amplifiant des nécroses à ce niveau. Les mélanges herbicides – régulateurs sont déconseillés si les conditions de croissance de la culture ne sont pas bonnes.

Les mélanges triples ainsi que les mélanges herbicides- fongicides, sont hasardeux

A. Falisse et B. Bodson, Coordonnateurs du groupe "Phytotechnie",
et X. Bertel, Coordonnateur du C.A.D.C.O.

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).