

C.A.D.C.O. - Actualité - Céréales du 28 avril 1999 (C06)

Les céréales évoluent ... et les maladies aussi.

Escourgeon

Dates des observations : 23-27/04/1999.

Localités suivies: Ath, Grand-Hallet, Lonzée, Ohey, Pailhe, Sirault, Warsage, Waremme, Weillen

Variétés observées : Carola, Jamaïque, Majestic, Nickel, Sarah, Seychelles, Tiffany

La majorité des cultures est au stade deuxième nœud (32), et plusieurs ont déjà largement dépassé ce stade, avec la dernière feuille pointante.

La situation sanitaire

Les deux maladies importantes, la **rhynchosporiose** et l'**helminthosporiose**, sont bien installées dans tous les champs observés. La première de ces maladies est observée de façon généralisée sur presque toutes les plantes. Elle a pris une très forte extension et se retrouve très régulièrement sur l'avant-dernière feuille formée dans beaucoup de champs. L'helminthosporiose est également observée dans tous les champs, mais à des fréquences plus faibles (maximum 25 %). Si une protection n'a pas été appliquée, il apparaît indispensable d'intervenir. Dans l'application du traitement, il faut veiller à avoir une couverture homogène des feuilles.

Fumure

La fraction de dernière feuille doit être apportée. La dose de référence de 50 unités est maintenue. Elle doit bien sur être modulée en fonction des conditions culturales de chaque parcelle (voir Livre Blanc).

Régulateur

Le régulateur de croissance à base d'éthéphon doit être appliqué à partir du stade dernière feuille étalée en mélange avec le fongicide.

Froment

Dates des observations : 23-27/04/1999.

Localités suivies: Ath, Avernas, Bombaye, Corbais, Forville, Fraire, Gembloux, Hanneche, Herchies, Lens-St.-Remy, Lisogne, Ligny, Lonzée, Merbes, Thynes, Tinlot, Wavre, Villers-le-Peuplier

Variétés observées : Beaufort, Cockpit, Cyrano, Folio, Hussar, Igor, Isengrain, Mercury, Ordeal, Pajero, Record, Sponsor, Trémie, Versailles, Vivant et Windsor.

La majorité des cultures sont au stade premier nœud (31), mais plusieurs parcelles sont encore au stade redressement (30).

La situation sanitaire

Parmi les maladies du pied, la **fusariose** est la plus fréquente. Le **Piétin verse** offre une situation assez homogène avec des taux de présence qui restent faibles (généralement sous 10 %) mais avec des pointes allant jusqu'à 40 %.

La **septoriose** du feuillage se développe de façon très contrastée au niveau des champs. Il y a une absence quasi totale par endroit (Gembloux). A l'opposé, il y a des champs en situation de risque élevé (Avernas, Hanneche, Ligney, Bombaye).

L'**oïdium** est absent dans la majorité des champs observés. Dans plusieurs situations, la maladie peut-être facilement observée sur les feuilles semi-sénescentes de la base, mais des foyers à forte évolution sont sporadiquement observés (Fraire).

Les **rouilles** ont déjà été signalées à Ath et à Herchies. Ces maladies n'ont pas évolué par rapport à l'observation précédente. La rouille jaune est encore signalée à de faibles taux, moins de 5 % sur les feuilles de la base (Ath, Herchies et Lens-Saint-Rémy).

L'avant-dernière feuille se développera sous peu. Dans le cas d'une forte évolution de la septoriose, des protections précoces pourraient être envisagées à court terme. On conseille cependant d'attendre le prochain avis vu le stade encore souvent trop précoce des céréales.

Monsieur Jean-Marc Moreau, du Centre de Recherche en Agrométéorologie et en Protection des Grandes Cultures, qui collabore avec le CADCO, développe un site Internet d'actualité en maladies des céréales L'avis CADCO peut y être consulté, ainsi que des informations plus précises sur les maladies en blé d'hiver. L'adresse de ce site est <http://www.agro.ucl.ac.be/fymy/proculture>

Le prochain avis sur les maladies du froment est prévu pour la semaine du **3 mai 1999**.

Fumure

La deuxième fraction doit être apportée, si cela n'a pas déjà été fait, sur tous les froments hormis ceux implantés en février et mars qui n'ont pas encore atteint le stade redressement.

Désherbage

Veillez à terminer les dés herbages même sur les semis tardifs.

Régulateur

Le Cycocel doit être appliqué entre le stade redressement et le stade 2^{ème} nœud lorsque les conditions de croissance sont poussantes.

J. COLIN *Coordonnateur du groupe « maladies »*
A. Falisse et B. Bodson, *Coordonnateurs du groupe "Phytotechnie"*,
et X. Bertel, *Coordonnateur du C.A.D.C.O.*

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).