



Actualité – céréales du 03 juin 1999 (C14)

RAVAGEURS DU FROMENT, QUELLE MENACE ?

Les populations de pucerons ont augmenté dans tous nos champs d'observation et approchent les 100 individus par 100 talles dans les champs les plus atteints. Il s'agit surtout du puceron de l'épi.

Les prédateurs et les parasites de pucerons sont eux, plutôt rares.

Il faut donc redouter le développement de populations importantes de pucerons au cours des prochains jours.

Dans les froments les plus atteints et approchant ou ayant déjà atteint le stade épiaison, l'application d'insecticide (en même temps que le fongicide d'épiaison) devrait s'avérer rentable. A ce stade, les pyréthrinoïdes sont les produits les plus indiqués. Outre les pucerons de l'épi, ces insecticides combattent également des ravageurs secondaires comme les criocères (*lema*), les thrips et les mineuses.

Les traitements insecticides n'ont guère de persistance en été. Il n'est donc pas exclu qu'une recolonisation survienne, d'autant plus que nous sommes tôt en saison.

Nos observations continuent, le prochain avis sera diffusé pour jeudi prochain.

M. De Proft, Coordinateur du groupe « ravageurs »
et X. BERTEL, Coordinateur du C.A.D.C.O.

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).