



Actualité – céréales du 10 juin 1999 (C15)

RAVAGEURS DU FROMENT, QUELLE MENACE ?

Les pluies abondantes des derniers jours ont limité le développement des populations de pucerons. Toutefois, le niveau est un peu plus élevé que la semaine dernière et avoisine les 100 pucerons /100 talles dans les champs les plus atteints, ce qui est assez élevé pour une date aussi précoce. Il s'agit principalement du puceron de l'épi.

Les prédateurs et les parasites de pucerons sont encore assez rares et les populations de pucerons pourraient croître rapidement au cours des prochaines semaines. Dans les froments les plus atteints et approchant ou ayant déjà atteint le stade épiaison, l'application d'insecticide (en même temps que le fongicide d'épiaison) devrait s'avérer rentable. A ce stade, les pyréthrinoïdes sont les produits les plus indiqués. Outre les pucerons de l'épi, ces insecticides combattent également des ravageurs secondaires comme les criocères (*lema*), les thrips et les mineuses.

Nos observations continuent, le prochain avis sera normalement diffusé pour le jeudi 17 juin au plus tard.

M. De Proft, Coordinateur du groupe « ravageurs »
et X. BERTEL, Coordinateur du C.A.D.C.O.

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).